

FOTON

AKTYWATOR AMINOKWASOWY
Z MIKROELEMENTAMI

NOWOŚĆ



WZMACNIA I POLEPSZA KONDYCJĘ ROŚLIN

- Intensywne stymulowanie procesów metabolicznych roślin
- Szybka regeneracja i poprawa kondycji roślin
- Zwiększenie ilości i jakości plonu

 **INTERMAG**
SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI WIEDZY

www.intermag.pl

OPIS I PRZEZNACZENIE


FOTON to dolistny aktywator aminokwasowy o działaniu silnie stymulującym procesy fizjologiczne zachodzące w roślinie, w tym fotosyntezę, która bezpośrednio wpływa na ilość i jakość plonu. Szczególnie zalecany do zastosowania w przypadku zaobserwowania słabszej kondycji roślin na skutek wystąpienia, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Dzięki unikalnej formule łączącej działanie aminokwasów, mikroelementów oraz technologii INT (Innovative Nutrient Transfer) szybko przywraca roślinom odpowiedni wigor oraz poziom chlorofilu niezbędny do prowadzenia procesu fotosyntezy.


FOTON zawiera w swoim składzie kompleks aminokwasów, które zwiększają tolerancję roślin na niekorzystne warunki uprawy oraz przyspieszają regenerację po wystąpieniu warunków stresowych.

FOTON polecany jest dla gatunków roślin rolniczych do stosowania profilaktycznego w okresach intensywnego wzrostu i rozwoju roślin lub interwencyjnego, po wystąpieniu oznak osłabienia kondycji roślin.


Najważniejsze korzyści ze stosowania aktywatora **FOTON**:



1. Intensywne stymulowanie procesów metabolicznych roślin



2. Szybka regeneracja i poprawa kondycji roślin



3. Zwiększenie ilości i jakości plonu

STOSOWANIE

FOTON stosować należy w formie roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami, po sprawdzeniu możliwości mieszania. W trakcie zabiegów unikać dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury oraz wiatru powodującego znoszenie kropel.

Jednorazowa dawka nawozu **FOTON:** 1-2 l/ha.

Ilość cieczy użytkowej dostosować do wymagań poszczególnych gatunków roślin oraz techniki oprysku.

-  **PROFILAKTYCZNIE:** wykonać 2-4 zabiegi łącznie z innymi agrochemikaliami, co 10-21 dni w okresach intensywnego rozwoju i wzrostu roślin.
-  **INTERWENCYJNIE:** stosować kilkakrotnie po zauważeniu słabszej kondycji roślin lub co 3-7 dni bezpośrednio po wystąpieniu niekorzystnych warunków uprawy.